



⑮ **BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT**

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 101 63 130 A 1**

⑤① Int. Cl. 7:
C 07 K 7/06

② Aktenzeichen: 101 63 130.8
⑦ Anmeldetag: 20. 12. 2001
④③ Offenlegungstag: 10. 7. 2003

DE 101 63 130 A 1

⑦① Anmelder:
Cyto Tools GmbH, 64287 Darmstadt, DE

⑦④ Vertreter:
Luderschmidt, Schüler & Partner, 65189 Wiesbaden

⑦② Erfinder:
Freyberg, Mark Andre, Dr., 64287 Darmstadt, DE;
Friedl, Peter, Prof. Dr., 64823 Groß-Umstadt, DE;
Kaiser, Dirk, Dr., 64859 Eppertshausen, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Rechercheantrag gem. Paragraph 43 Abs. 1 Satz PatG ist gestellt

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ Apoptotisch wirksame Peptide

⑤⑦ Gezeigt werden spezifische Aminosäuresequenzen, wobei davon abgeleitete Peptide und/oder Peptidmimetika die Apoptose beeinflussen, sowie deren Verwendung zur Herstellung von Medikamenten.

DE 101 63 130 A 1

Beschreibung

- [0001] Die vorliegende Erfindung betrifft apoptotisch wirksame Peptide sowie deren Verwendung zur Herstellung von Medikamenten.
- 5 [0002] Apoptose ist ein genetisch kodiertes Selbstmordprogramm, welches in eukaryontischen Zellen unter bestimmten physiologischen oder pathologischen Bedingungen induziert wird. Die Induktion der Apoptose muss ausserordentlich präzise reguliert sein, denn eine Hyperaktivität kann zu degenerativen Erkrankungen führen. Auf der anderen Seite kann eine verringerte Apoptose-Induktion zur Tumorprogression beitragen.
- [0003] Verschiedene niedermolekulare Induktoren der Apoptose wurden bereits beschrieben. Eine wichtige Klasse sind Tumorstatische. Auf welche Weise diese Cytostatika oder andere Substanzen Apoptose induzieren können, ist in den meisten Fällen jedoch unbekannt.
- [0004] Die Induktion von Apoptose kann beispielsweise über eine Reihe von sog. Todesrezeptoren, d. h. Rezeptoren, die eine "Death Domain" (DD) enthalten, wie CD95, TNF-R1, DR3, DR4 oder DR5, erfolgen, die nach Bindung ihrer Liganden Apoptose-Signalwege induzieren. Beispielsweise interagiert nach Bindung des CD95-Liganden der CD95-Rezeptor mit dem Adapterprotein FADD/MORT1, wodurch das "Recruitment" und die Aktivierung der Protease FLICE/Caspase-8, am DISC "Death Inducing Signalling Complex" induziert werden. FADD und FLICE enthalten jeweils "Death Effector Domains" (DED). Die Induktion der Apoptose über diese Apoptose-Signalwege ist von aussen beispielsweise durch die Gabe von Zellgiften (cytotoxischen Substanzen), Bestrahlung, Viren, Entzug von Wachstumsfaktoren oder mechanische Zellverletzung möglich. Diese Möglichkeiten der Apoptose-Induktion sind allerdings von bestimmten
- 15 [0005] Nachteilen begleitet. So führt die Gabe von Zellgiften, wie Cytostatika, oder die Bestrahlung bei Krebszellen zur Resistenzentwicklung und darüber hinaus zu einer Schädigung normaler Zellen, bei denen eigentlich keine Apoptose ausgelöst werden sollte.
- [0005] Im allgemeinen wird z. B. die Induktion der Apoptose vorgeschlagen zur Behandlung von Krebs, zur Verhinderung von angiogenetischen Vorgängen etc. Obwohl hier bereits Induktoren beschrieben wurden, weisen diese noch immer eine Reihe von Nachteilen auf. Beispielsweise erzeugen Cytostatika schwere Nebenwirkungen.
- 25 [0006] Es werden aber auch pathologische Zustände diskutiert, bei denen die Apoptose negative Auswirkungen hat, und zu deren Behandlung die Apoptose inhibiert werden muß.
- [0007] Ein Beispiel für eine solche Krankheit ist die Atherosklerose. Insbesondere konnte von den Erfindern schon früher gezeigt werden, daß gerade im Bereich der atherosklerotischen Plaques apoptotische Zellen (besonders: Endothelzellen, glatte Muskelzellen) auftreten, und daß dieses Auftreten durch gestörte Strömungsverhältnisse verstärkt wird, also strömungsabhängig ist (Freyberg et al., BBRC, 286, 141-149, 2001). Weiterhin konnten die Erfinder zeigen, daß Substanzen, die die Bindung von TSP-1 an LAP und/oder $\alpha_2\beta_1$ inhibieren, auch die strömungsabhängige Apoptose weitgehend inhibieren können.
- 30 [0008] Weitere Krankheiten, die in Zusammenhang mit einer verstärkt auftretenden Apoptose diskutiert werden, sind AIDS und Alzheimer.
- [0009] Es besteht daher ein hoher Bedarf an Substanzen, die die Apoptose positiv oder negativ beeinflussen. Insbesondere wäre es günstig, die strömungsabhängige und mit der Atherosklerose ursächlich verbundene Apoptose inhibieren zu können. Weiterhin besteht hoher Bedarf an pharmazeutischen Formulierungen, die solche Substanzen enthalten, und die zur Behandlung von Zuständen eingesetzt werden können, bei denen die Inhibition oder die Induktion der Apoptose angezeigt ist, insbesondere zur Behandlung der Arteriosklerose, aber auch von AIDS, Alzheimer und Krebs. Diese Substanzen sollten dabei möglichst von geringem Molekulargewicht und/oder kleine Peptide sein, um eine gute Bioverfügbarkeit zu gewährleisten.
- 40 [0010] Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, apoptotisch wirksame Substanzen, bevorzugt Peptide, zur Verfügung zu stellen. Insbesondere war es eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, Substanzen, bevorzugt Peptide, zur Verfügung zu stellen, die eine durch TSP-1 induzierte strömungsabhängige Apoptose der Endothelzellen inhibieren können. Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, pharmazeutische Zubereitungen zur Verfügung zu stellen, mit denen Krankheiten wie AIDS, Alzheimer und Krebs behandelt werden können, bei denen die Inhibition oder Induktion von Apoptose angezeigt ist.
- [0011] Diese und weitere, nicht explizit genannte Aufgaben, die sich aber aus der vorangegangenen Würdigung des Stands der Technik ohne weiteres ergeben, werden durch die in den Ansprüchen definierten Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung gelöst.
- 50 [0012] Insbesondere wird diese Aufgabe durch zur Verfügungstellen von Substanzen, die Peptide mit einer der in den SEQ ID NOs 1 bis 17 dargestellten Aminosäuresequenzen umfassen.
- [0013] Unter einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung handelt es sich dabei um Apoptose inhibierende Substanzen, die Aminosäuresequenzen der allgemeinen Formel (1):
- 55 R-A₁-Y-V-V-M umfassen,
- wobei A₁ für A, D, E, G, M, N, T, W oder Y steht, oder pharmazeutisch annehmbare Salze dieser Substanzen.
- 60 [0014] Unter einem weiteren bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung handelt es sich dabei um Apoptose induzierende Substanzen, die Aminosäuresequenzen der allgemeinen Formel (2):
- R-A₂-Y-V-V-A₃ umfassen,
- 65 wobei A₂ für A, L, P, S oder C steht, und A₃, falls A₂ für A steht, A ist, und falls A₂ für L, P, S oder C steht, M ist, oder pharmazeutisch annehmbare Salze dieser Substanzen.
- [0015] Für die Zwecke der vorliegenden Erfindung wird der international übliche Einbuchstabencode für Aminosäuren verwendet, A steht also für Alanin (Ala), C für Cystein (Cys), D für Asparaginsäure (Asp), E für Glutaminsäure (Glu), F

für Phenylalanin (Phe), G für Glycin (Gly), L für Leucin (Leu), M für Methionin (Met), N für Asparagin (Asn), P für Prolin (Pro), R für Arginin (Arg), S für Serin (Ser), T für Threonin (Thr), V für Valin (Val), W für Tryptophan (Trp) und Y für Tyrosin (Tyr).

[0016] Unter einem besonders bevorzugten Gesichtspunkt betrifft die vorliegende Erfindung daher Apoptose inhibierende Substanzen, bevorzugt Proteine oder Peptide, die eine der unter SEQ ID NO 1 bis SEQ ID NO 11 gezeigten Peptidsequenzen umfassen, oder deren entsprechende pharmazeutisch annehmbare Salze.

[0017] Unter einem weiteren besonders bevorzugten Gesichtspunkt betrifft die vorliegende Erfindung auch Apoptose induzierende Substanzen, bevorzugt Proteine oder Peptide, die eine der unter SEQ ID NO 12 bis SEQ ID NO 17 gezeigten Peptidsequenzen umfassen, oder deren entsprechende pharmazeutisch annehmbare Salze.

[0018] Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung die Verwendung der erfindungsgemäßen Substanzen, bevorzugt Proteine oder Peptide umfassend mindestens eine der in SEQ ID NO 1 bis SEQ ID NO 11 dargestellten Aminosäuresequenz zur Herstellung von Medikamenten, insbesondere zur Herstellung von Medikamenten zur Behandlung von Arteriosklerose, AIDS und Alzheimer, und ganz besonders bevorzugt hierbei Arteriosklerose.

[0019] Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung die Verwendung der erfindungsgemäßen Peptide umfassend mindestens eine der in SEQ ID NO 12 bis SEQ ID NO 17 dargestellten Aminosäuresequenz zur Herstellung von Medikamenten, insbesondere zur Herstellung von Medikamenten zur Behandlung von Krebs.

[0020] Überraschenderweise wurde von den Erfindern gezeigt, daß Peptide die eine durch Formel (1) dargestellte Aminosäuresequenz umfassen, in überaus starkem Maße Apoptose inhibieren. Insbesondere sind diese Peptide hervorragend dazu geeignet, die strömungsabhängige, TSP-1 induzierte Apoptose von Endothelzellen zu inhibieren. Es wird jedoch vermutet, daß diese Peptide auch dazu in der Lage sind, bei anderen Zellen die Apoptose zu inhibieren.

[0021] Als ganz besonders bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung werden folgende Peptide/Peptidsequenzen zur Verfügung gestellt:

1. R-A-Y-V-V-M (SEQ ID NO 1)
2. R-W-Y-V-V-M (SEQ ID NO 2)
3. R-Y-Y-V-V-M (SEQ ID NO 3)
4. R-E-Y-V-V-M (SEQ ID NO 4)
5. K-R-A-Y-V-V-M-W-K-K (SEQ ID NO 5)
6. K-R-E-Y-V-V-M-W-K-K (SEQ ID NO 6)
7. R-G-Y-V-V-M (SEQ ID NO 7)
8. R-M-Y-V-V-M (SEQ ID NO 8)
9. R-T-Y-V-V-M (SEQ ID NO 9)
10. R-N-Y-V-V-M (SEQ ID NO 10)
11. R-D-Y-V-V-M (SEQ ID NO 11)
12. M-V-V-Y-F-R (SEQ ID NO 12)
13. R-A-Y-V-V-A (SEQ ID NO 13)
14. R-L-Y-V-V-M (SEQ ID NO 14)
15. R-P-Y-V-V-M (SEQ ID NO 15)
16. R-S-Y-V-V-M (SEQ ID NO 16)
17. R-C-Y-V-V-M (SEQ ID NO 17)

[0022] Für die Zwecke der vorliegenden Erfindung wird unter dem Begriff "Peptid" eine Substanz verstanden, die aus einer oder mehrere Ketten von mehreren, d. h. 2 oder mehr, durch Peptidbindungen verbundenen Aminosäuren, besteht.

[0023] Für die Zwecke der vorliegenden Erfindung wird unter dem Begriff "Protein" eine Substanz verstanden, in der mehrere "Peptide" durch Peptidbindungen miteinander verbunden sind. Diese Definition umfasst gleichermaßen native Proteine als auch zumindest teilweise "künstliche" Proteine, wobei solche "künstlichen" Proteine z. B. durch Anfügen von chemischen Resten an die Aminosäurekette verändert sein können, die bei nativen Proteinen normalerweise nicht vorkommen.

[0024] Für die Zwecke der vorliegenden Erfindung wird unter "apoptotisch wirksam" verstanden, dass der Zusatz der entsprechenden Substanz in das in den Beispielen 5 und 6 gezeigte Testsystem einen positiven oder negativen Inhibitionsindex erzeugt. Insbesondere werden hierfür Endothelzellen, besonders bevorzugt HUVEC, in Medium kultiviert, welches 1 µg TSP-1 pro ml enthält. Die prozentualen Apoptosewerte dieser Positivkontrolle dienen dann wie in den Beispielen gezeigt der Berechnung des Inhibitionsindex für die Substanzen, die als potentielle Inhibitoren zusammen mit dem Induktor TSP-1 in parallelen Untersuchungen eingesetzt werden. Eine Negativkontrolle zeigt das Fehlen sonstiger Induktoren an.

[0025] Ein positiver Inhibitionsindex zeigt dabei an, dass die entsprechende Substanz die Apoptose inhibiert. Ein negativer Inhibitionsindex zeigt dabei an, dass die verwendete Substanz die Apoptose induziert, d. h. die TSP-1 induzierte Apoptose verstärkt.

[0026] Native Peptide weisen allerdings oft eine geringe metabolische Stabilität gegenüber Peptidasen und eine relativ schlechte Bioverfügbarkeit auf.

[0027] Ausgehend von den oben gezeigten Peptiden kann der Fachmann ohne erfinderisches Zutun eine ganze Reihe von abgeleiteten Verbindungen entwickeln, die eine ähnliche oder gleichartige Wirkungsweise besitzen, und die u. a. auch Peptidmimetica genannt werden.

[0028] Als Peptidmimetica werden dabei für die Zwecke der vorliegenden Erfindung Verbindungen bezeichnet, welche die Struktur von Peptiden nachahmen und als Liganden in der Lage sind, die biologische Aktivität auf Rezeptor-/Enzymebene zu imitieren (Agonist) oder zu blockieren (Antagonist). Vor allem sollen die Peptidmimetica eine verbesserte Bioverfügbarkeit und eine verbessert metabolische Stabilität aufweisen. Die Art der Mimetisierung kann von der leicht veränderten Ausgangsstruktur bis zum reinen Nichtpeptid reichen. Siehe beispielsweise A. Adang et al., Recl. Trav.

Chim. Pays-Bas 113 (1994), 63–78.

[0029] Im Prinzip bieten sich folgende Möglichkeiten zur Mimetisierung/Derivatisierung einer Peptidstruktur an:

- Verwendung von D- statt L-Aminosäuren
 - Modifizierung der Seitenkette von Aminosäuren
 - Veränderung/Verlängerung der Peptidhauptkette
 - Cyclisierung zur Konformationsstabilisierung
 - Verwendung von Templaten, die eine bestimmte Sekundärstruktur erzwingen
- 10 [0030] Während die proteolytische Stabilität eines Peptids durch Austausch von L- gegen D-Aminosäuren gesteigert werden kann, führt die Modifikation der Seitenketten einer der Aminosäuren oft zu einer Verbesserung der Bindungseigenschaften des gesamten Peptids.
- [0031] Bei der Veränderung des Peptidrückgrates erfolgt in der Regel ein Austausch einer Amidgruppe gegen amidähnliche Gruppierungen (J. Gante, Angew. Chem. 106 (1994), 1780–1802). Durch diese Maßnahmen lassen sich sowohl
- 15 die Bindungsaffinität als auch die metabolische Stabilität des nativen Peptids beeinflussen.
- [0032] Durch die Cyclisierung eines linearen Peptids wird dessen Flexibilität und damit dessen globale Konformation festgelegt. Bei Fixierung der biologisch aktiven Konformation wird die Affinität des Peptids zum Rezeptor erhöht, da die Entropieabnahme bei der Bindung kleiner ist als bei der Bindung eines flexiblen, linearen Peptids. Zu diesem Zweck werden Aminosäureseitenketten, die nicht an der Rezeptorerkennung beteiligt sind, miteinander oder mit dem Peptidge-
- 20 rüst verknüpft.
- [0033] Die Sekundärstruktur des Peptids spielt eine entscheidende Rolle für die molekulare Erkennung des Rezeptors. Neben α -Helix und β -Faltblatt sind sogenannte Turns als Wendepunkte in der Peptidkette wichtige Konformationselemente. Der Ersatz dieser Struktureinheiten durch einen Baustein, welcher nach dem Einfügen in ein Peptid eine definierte Sekundärstruktur stabilisiert, hat zum Konzept des Sekundärstrukturmimetikum geführt.
- 25 [0034] Auch die Wasserlöslichkeit der Peptide kann beispielsweise durch Einführung von S- und C-Glycopeptid Derivaten erhöht werden. Weitere Maßnahmen können beispielsweise die PEGylierung der Peptide sein.
- [0035] Auch die Lipophilie der Hexapeptide kann erhöht werden, indem beispielsweise Phenylalanine an die Peptidsequenz angehängt werden.
- [0036] Die Cyclisierung bzw. die N-terminale Modifikation von Peptiden wird z. B. von Borchard, Journal of controlled Release 62 (1999), 231–238 und von Blackwell et al., J. Org. Chem. 10 (2001), 5291–302 beschrieben.
- 30 [0037] Es ist daher klar, daß der Fachmann ausgehend von dem durch die vorliegende Erfindung vermittelte Wissen mit Leichtigkeit zu einer ganzen Reihe von abgeleiteten Peptidmimetika gelangen kann, die jedoch alle von der vorliegenden Erfindung mitumfasst sind.
- [0038] Unter einem weiteren bevorzugten Gesichtspunkt stellt die vorliegende Erfindung daher auch Peptidmimetika zur Verfügung, die aus den SEQ ID Nos 1–17 abgeleitet sind, sowie Substanzen, die solche Peptidmimetika umfassen.
- 35 [0039] Insbesondere stellt die vorliegende Erfindung unter einem weiteren bevorzugten Gesichtspunkt die Verwendung von aus den SEQ ID Nos 1 bis 11 abgeleiteten Peptidmimetika und solche Peptidmimetika umfassenden Substanzen zur Herstellung eines Medikamentes zur Behandlung von Atherosklerose, AIDS und Alzheimer, und hierbei bevorzugt Atherosklerose zur Verfügung.
- 40 [0040] Insbesondere stellt die vorliegende Erfindung unter einem weiteren bevorzugten Gesichtspunkt die Verwendung von aus den SEQ ID NOs 12 bis 17 abgeleiteten Peptidmimetika und solche Peptidmimetika umfassenden Substanzen zur Herstellung eines Medikamentes zur Behandlung von Krebs zur Verfügung.
- [0041] Erfindungsgemäße Substanzen, die aktive Bestandteile einer pharmazeutischen Zubereitung sind, werden im Allgemeinen in einem pharmazeutisch annehmbaren Träger gelöst. Beispiele für pharmazeutisch annehmbare Träger
- 45 können Pufferlösungen wie Pufferpuffer oder Citratpuffer sein. Zur Aufrechterhaltung der Aktivität der Peptide können auch Reagentien zugesetzt werden, die pharmazeutisch annehmbar sind und beispielsweise ein reduzierendes Milieu in der pharmazeutischen Zubereitung aufrechterhalten.
- [0042] Die spezifische Dosierung und Posologie ist für jeden Patienten von einer Anzahl von Faktoren abhängig, einschließlich der Aktivität der verwendeten spezifischen Verbindungen, dem Alter des Patienten, dem Körpergewicht, dem
- 50 allgemeinen Gesundheitszustand, dem Geschlecht, der Ernährung, der Zeit der Verabreichung, dem Weg der Verabreichung, der Exkretionsrate, der Verbindung mit anderen Arzneimitteln und der Schwere der einzelnen Erkrankung, für die die Therapie angewandt wird. Sie wird von einem Arzt in Abhängigkeit von diesen Faktoren ermittelt.
- [0043] Peptidmedikamente werden üblicherweise parenteral verabreicht, z. B. durch ein Inhalationsspray, rektal, durch subkutane, intravenöse, intramuskuläre, intraartikuläre und intrathecale Injektions- und Infusionstechniken, oder außerdem in pharmazeutischen Formulierungen, welche konventionelle, pharmazeutisch annehmbare Träger, Adjuvantien und Vehikel enthalten. Je nach Art der identifizierten Substanz kommen auch andere Verabreichungswege in Betracht, z. B. oral.
- 55 [0044] Die Erfindung stellt ebenso pharmazeutische Zusammensetzungen bereit, die eine wirksame Menge einer apoptisch wirksamen Substanz, bevorzugt eines Peptids, Proteins oder Peptidmimetikums in Kombination mit einem konventionellen pharmazeutischen Träger umfassen. Ein pharmazeutischer Träger ist z. B. ein fester oder flüssiger Füllstoff, ein Verkapselungsmaterial oder ein Lösungsmittel. Beispiele für Materialien, die als pharmazeutische Träger dienen können, sind Zucker wie Lactose, Glucose und Saccharose; Stärke wie Maisstärke und Kartoffelstärke; Cellulose und deren
- 60 Derivate wie Natriumcarboxymethylcellulose, Ethylcellulose und Celluloseacetat; pulverisierter Tragacanth; Malz; Gelatine; Talg; Arzneimittelträger wie Kakaobutter und Zäpfchenwachs; Öle wie Erdnussöl, Baumwollsaamenöl, Färberdistelöl, Sesamöl, Olivenöl, Maisöl und Sojabohnenöl; Polyole wie Propylenglykol, Glycerin, Sorbitol, Mannitol und Polyethylenglykol; Ester wie Ethyloleat und Ethyllaureat; Agar; Puffermittel wie Magnesiumhydroxid und Aluminiumhydroxid; Alginsäure; Pyrogen-freies Wasser; isotonische Salzlösung; Ringers Lösung, Ethylalkohol und Phosphatpufferlösungen wie auch andere nichttoxische kompatible Substanzen, die in pharmazeutischen Formulierungen verwendet

werden. Benetzungsmittel, Emulgatoren und Gleitmittel wie Natriumlaurylsulfat und Magnesiumstearat, wie auch Färbemittel, Beschichtungsmittel sowie Parfümierungsmittel und Konservierungsstoffe können ebenso in den Zubereitungen vorhanden sein, entsprechend den Anforderungen des Galenikers. Die Menge des aktiven Wirkstoffes, der mit den Trägermaterialien kombiniert wird, um eine Einzeldosis zu produzieren, wird abhängig von dem behandelten Patienten und der speziellen Methode der Verabreichung variieren.

[0045] Pharmazeutisch annehmbare Salze der erfindungsgemäßen Substanzen, bevorzugt Peptide, Proteine oder Peptidmimetica können auf gut bekanntem Weg, beispielsweise durch Lösen der erfindungsgemäßen Verbindungen in der entsprechenden, verdünnten Säure oder Base, z. B. Salzsäure oder Natronlauge, und anschliessendem Gefriertrocknen hergestellt werden. Metallsalze können erhalten werden durch Lösen der erfindungsgemäßen Verbindungen in Lösungen, die das entsprechende Ion enthalten, und anschliessendem Isolieren der Verbindung über HPLC oder Gelpermeationsverfahren.

[0046] Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung näher:

BEISPIEL 1

Kultivierung von humanen Endothelzellen aus Nabelschnur-Venen (HUVEC)

Lösungen (steril)

Kulturmedium: IF-Basalmedium + 15% (v/v) NCS, 5 µg/ml Transferrin, 5 µg/ml Heparin, 0,7 µg/ml FGF, 2 mM L-Glutamin [IF-Basalmedium: 1 : 1-Mischung aus Iscove's Modifiziertem Dulbecco's Medium (IMDM) und Ham's F12, beide von Life Technologies, Paisley (England)]

NCS: Serum neugeborener Kälber (Sebak, Aidenbach)

FGF: Fibroblastenwachstumsfaktor (eigene Herstellung, gereinigt aus Schweinehirn)

Materialien

Zellkulturgefäße, gelatiniert

Durchführung

[0047] Die Kultivierung von HUVEC erfolgt in gelatinebeschichteten Kulturgefäßen bei 37°C, 5% CO₂ und Wasserdampf-gesättigter Atmosphäre. Das Kulturmedium wird alle 2–3 Tage gewechselt; bei Konfluenz werden die Zellen mit einer Teilungsrate von 1 : 3 bis 1 : 5 passagiert. HUVEC wachsen streng kontakthinhibiert und bilden einschichtige Zellrasen mit der typischen Kopfsteinpflastermorphologie. Bei Konfluenz erreichen die Kulturen Zelldichten von 4–9 × 10⁴ Zellen/cm². Für Apoptoseuntersuchungen werden ausschließlich HUVEC-Kulturen der Passagen 1–4 verwendet.

Beschichtung von Kulturgefäßen

Lösungen (steril)

Gelatinelösung, 1% (w/v) in Milli-Q-Wasser

1 g Gelatine (zellkulturgetestet) in 100 ml Milli-Q-Wasser suspendieren, durch Autoklavieren für 20 min bei 121°C und 2 bar lösen und bei Raumtemperatur lagern.

PBS (140 mM NaCl, 3 mM KCl, 8 mM Na₂HPO₄, 1,5 mM KH₂PO₄)

8 g/l NaCl

0,2 g/l KCl

1,44 g/l Na₂HPO₄ × 2H₂O

0,2 g/l KH₂PO₄

[0048] Die Salze in einem entsprechenden Volumen Milli-Q-Wasser lösen, 20 min bei 121°C und 2 bar autoklavieren und bei Raumtemperatur lagern. Der pH-Wert wird überprüft und liegt zwischen 7,2 und 7,4.

Materialien

Zellkulturgefäße

Durchführung

[0049] Für die Kultivierung adhärent wachsender Zellen werden Kulturgefäße mit Gelatine beschichtet. Der Boden der Zellkulturgefäße wird mit steriler Gelatinelösung bedeckt, die Zellkulturgefäße werden 15 min bei Raumtemperatur belassen. Die Gelatinelösung wird abgesaugt, die Zellkulturgefäße werden einmal mit PBS gewaschen und können so verwendet werden.

Subkultivierung adhärenter Zellen

Lösungen (steril)

PBS

DE 101 63 130 A 1

Trypsin/EDTA-Lösung

0,05% (w/v) Trypsin und 0,02% (w/v) EDTA in PBS auflösen und sterilfiltrieren.

Materialien

5

Zellkulturgefäße, gelatinisiert

Durchführung

- 10 [0050] Die Zellen werden mit Trypsin/EDTA-Lösung von der Kulturfläche abgelöst. Das Kulturmedium wird abgesaugt, der Boden des Kulturgefäßes kurz mit PBS gewaschen und mit Trypsin/EDTA-Lösung (~1 ml für eine 25 cm²-Kulturflasche) bedeckt. Die Enzymlösung wird sofort wieder abgesaugt, so daß ein dünner Flüssigkeitsfilm auf den Zellen verbleibt. Die Zellen werden 1–10 min bei Raumtemperatur belassen und das Ablösen der Zellen unter dem Mikroskop verfolgt. Das Ablösen der Zellen kann durch sanftes Aufschlagen des Kulturgefäßes auf der Kante beschleunigt werden. Die Zellen werden in frischem Kulturmedium aufgenommen, eventuell gezählt und in neue Kulturgefäße ausgesät.
- 15

BEISPIEL 2

20

Bestimmung der Apoptoserate durch Färbung apoptotischer Zellen mit DAPI

[0051] DAPI gehört zur Indolfarbstoffgruppe und ist ein selektiver DNS-Farbstoff. Der Farbstoff wird bei 340–360 nm angeregt, und das Emissionsmaximum liegt bei 480 nm. Er wird für Apoptoseuntersuchungen eingesetzt [vgl. Cohen et al., Immunology Today, 14, No. 3, 126–130 (1993)].

25

Morphologische Auswertung

Lösungen

30 PBS

Formaldehydlösung

4% (v/v) Formaldehyd in PBS

DAPI-Lösung (Molecular Probes, Leiden, Niederlande)

2 µg/ml DAPI in Methanol

35

Materialien

Petrischale (35 mm) mit Zellen in Kultur

40

Durchführung

- [0052] Der Kulturüberstand einer Petrischale wird abgesaugt, der Zellrasen wird 15 Minuten mit 1 ml Formaldehydlösung auf Eis fixiert, zweimal mit 2 ml PBS gewaschen, für 15 Minuten mit 0,5 ml DAPI-Lösung versetzt, mit PBS gewaschen und unter dem Fluoreszenzmikroskop ausgewertet. Es wird mit dem UV-Filtersatz und einem 20 × oder 40 × Objektiv gearbeitet. 500–1000 Zellen werden zufällig ausgewählt und die Zellen mit apoptotischen Kernen gezählt.
- 45 [0053] Der Apoptose-Index wird nach folgender Formel berechnet:

Apoptose-Index [%] = Anzahl apoptotischer Zellen/Gesamtzellzahl × 100

50

Durchflußcytometrie

Lösungen

55 PBS

Medium

Ethanol (p. a.) eisgekühlt (-20°C)

DAPI-Puffer

DAPI-Stammlösung

60

DAPI-Färbelösung

Durchführung

- [0054] Der Kulturüberstand wird abgesaugt, und die Zellen werden, ohne sie mit PBS zu waschen, trypsiniert. Die Zellsuspension wird in Medium aufgenommen, gezählt, bei 800 × g für 5 Minuten zentrifugiert, das Sediment in 0,5 ml IF resuspendiert und in 1,5 ml eiskaltes Ethanol getropft. Die Suspension wird über Nacht bei -20°C gelagert. Nach erneuter Zentrifugation und Resuspendierung des Sediments in 2 ml PBS folgt eine halbstündige Inkubation bei 37°C, eine weitere Zentrifugation, Resuspendierung des Sediments in 5 ml DAPI-Lösung und Auszählung im Durchflußcytometer
- 65

DE 101 63 130 A 1

bei einer Zählrate von 50–300 Ereignissen pro Sekunde. Die erhaltene Auftragung zeigt einen hohen Gipfel an Zellen in der G₁-Phase des Zellzyklus, gefolgt von einer Fraktion von Zellen in der S-Phase (mittlere Fluoreszenzintensitäten) und einem letzten Gipfel hoher Fluoreszenzintensitäten, der die Zellen in der G₂-Phase repräsentiert. Apoptotische Zellen erscheinen, bedingt durch die abnehmende absolute DNS-Menge pro Zelle, in einem Sub-G₁-Gipfel [Darzynkiewicz Z. et al., Cytometry, 13, 795–808 (1992); Zamai L. et al., Cytometry, 14, 891–897 (1993)]. Dies zeigt das Auftreten einer Apoptose unter den gewählten Bedingungen. 5

BEISPIEL 3

Induktion der Apoptose und Testsystem für apoptotisch wirksame Peptide bzw. Proteine bei kultivierten Endothelzellen 10

[0055] Die Zellen werden wie in Beispiel 1 beschrieben kultiviert. Nach dem Erreichen der vollständigen Konfluenz werden die Zellen für den Test eingesetzt. Zunächst wird Thrombospondin 1 (1 µg/ml) zu frischem Medium gegeben und mit der Wirkung von frischem Medium auf die Apoptoserate von HUVEC verglichen. Tabelle 1 zeigt, daß die Zugabe von Thrombospondin zu einer signifikanten Erhöhung der Apoptoserate führt. Die beobachtete Apoptose bei Zugabe von frischem Medium wird durch das während der Dauer des Experiments sekretierte Thrombospondin induziert. 15

Tabelle 1

Induktion der Apoptose bei HUVEC mit TSP-1 20

Kulturmedium	Apoptoserate (%) nach 24 h
frisches Medium	0,9 ± 0,1
frisch + TSP-1 (1 µg/ml)	3,0 ± 0,4

BEISPIEL 4

Peptidsynthese 30

[0056] Die verwendeten Peptide wurden durch das NMI (Naturwissenschaftliches und Medizinisches Institut an der Uni Tübingen, Reutlingen, Deutschland) nach Vorgaben der CytoTools synthetisiert. 35

BEISPIEL 5

Identifikation von apoptotisch wirksamen Hexamer-Peptiden mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens 40

[0057] Die Zellen werden wie in Beispiel 1 beschrieben kultiviert. Die Zellen werden in die entsprechenden Kulturgefäße (z. B. 24-Lochplatte/0,5 ml pro Kavität) ausgesät und nach dem Erreichen der vollständigen Konfluenz für den Test eingesetzt. Die Zellen werden mit neuem Medium versorgt:

- (a) frisches Kulturmedium [Basisrate der Apoptose], 45
- (b) frisches Medium mit 1 µg/ml TSP-1 [Apoptose induzierende Substanz; Kontrolle],
- (c) Medium (b) + Peptid der SEQ ID NO 1, 1 mM
- (d) Medium (b) + Peptid der SEQ ID NO 2, 1 mM
- (e) Medium (b) + Peptid der SEQ ID NO 3, 1 mM
- (f) Medium (b) + Peptid der SEQ ID NO 4, 1 mM 50
- (g) Medium (b) + Peptid der SEQ ID NO 7, 1 mM
- (h) Medium (b) + Peptid der SEQ ID NO 8, 1 mM
- (i) Medium (b) + Peptid der SEQ ID NO 9, 1 mM
- (j) Medium (b) + Peptid der SEQ ID NO 10, 1 mM
- (k) Medium (b) + Peptid der SEQ ID NO 11, 1 mM 55
- (l) Medium (b) + Peptid der SEQ ID NO 12, 1 mM
- (m) Medium (b) + Peptid der SEQ ID NO 13, 1 mM
- (n) Medium (b) + Peptid der SEQ ID NO 14, 1 mM
- (o) Medium (b) + Peptid der SEQ ID NO 15, 1 mM
- (p) Medium (b) + Peptid der SEQ ID NO 16, 1 mM 60
- (q) Medium (b) + Peptid der SEQ ID NO 17, 1 mM

[0058] Nach 24 h Inkubation unter Kulturbedingungen (Beispiel 1) werden die Zellen fixiert, mit DAPI gefärbt und morphologisch unter dem Fluoreszenzmikroskop untersucht bzw. durchflußcytometrisch untersucht. Die apoptotischen Zellen und die Gesamtzellzahl werden bestimmt und der Apoptoseindex berechnet (Prozent apoptotischer Zellen). Die Daten von 3 unabhängigen Experimenten mit der Angabe der Mittelwerte und der Standardabweichung sind in Tabelle 2 angegeben. Inhibitorisch wirksame Peptide weisen erfindungsgemäß einen positiven Inhibitionsindex auf, während induktorische Peptide erfindungsgemäß einen negativen Inhibitionsindex aufweisen. 65

Tabelle 2

[0059] Es werden folgende Peptide getestet:

SEQ ID NO	Aminosäure-Sequenz	Apoptose index [%]	Inhibitions -index [%]*
K	Kontrolle	$3,28 \pm 0,55$	
(1)	R-A-Y-V-V-M	$0,83 \pm 0,24$	$+75,3 \pm 7,5$
(2)	R-W-Y-V-V-M	$1,30 \pm 0,26$	$+61,9 \pm 7,7$
(3)	R-Y-Y-V-V-M	$0,85 \pm 0,17$	$+74,7 \pm 5,0$
(4)	R-E-Y-V-V-M	$1,04 \pm 0,30$	$+69,0 \pm 8,9$
(7)	R-G-Y-V-V-M	$1,83 \pm 0,37$	$+46,4 \pm 11,1$
(8)	R-M-Y-V-V-M	$1,84 \pm 0,39$	$+44,2 \pm 11,6$
(9)	R-T-Y-V-V-M	$1,86 \pm 0,36$	$+44,5 \pm 9,8$
(10)	R-N-Y-V-V-M	$2,06 \pm 0,53$	$+39,5 \pm 15,8$
(11)	R-D-Y-V-V-M	$2,12 \pm 0,47$	$+37,3 \pm 14,0$
(12)	M-V-V-Y-F-R	$4,40 \pm 0,53$	$-34,1 \pm 6,2$
(13)	R-A-Y-V-V-A	$4,98 \pm 0,3$	$-51,8 \pm 6,0$
(14)	R-L-Y-V-V-M	$6,41 \pm 0,63$	$-95,4 \pm 6,1$
(15)	R-P-Y-V-V-M	$5,67 \pm 0,54$	$-72,8 \pm 6,4$
(16)	R-S-Y-V-V-M	$6,86 \pm 0,37$	$-108,4 \pm 3,7$
(17)	R-C-Y-V-V-M	$13,97 \pm 0,35$	$-326,5 \pm 3,6$

* positiver Inhibitionsindex = Substanz inhibiert; negativer Inhibitionsindex = Substanz induziert;

[0060] Erfindungsgemäß wird der Inhibitionsindex wie folgt errechnet:

$$-\text{Inhibitionsindex [\%]} = (\text{gemessener Apoptoseindex} \cdot 100 / \text{Apoptoseindexkontrolle}) - 100$$

BEISPIEL 6

Verbesserung der Inhibitionswirkung durch Verlängerung der Aminosäurekette

[0061] Die Zellkultivierung und die Tests wurden wie in Beispiel 5 beschrieben durchgeführt. Die verwendeten Peptide sind in Tabelle 3 aufgeführt.

DE 101 63 130 A 1

Tabelle 3

Ergebnisse mit verlängerten Peptidsequenzen

SEQ ID NO	Aminosäure-Sequenz	Apoptose -index [%]	Inhibitions -index [%]*
	Kontrolle	$8,73 \pm 0,43$	
(5)	K-R-A-Y-V-V-M-W-K-K	$0,37 \pm 0,22$	$+95,8 \pm 2,6$
(6)	K-R-E-Y-V-V-M-W-K-K	$0,48 \pm 0,22$	$+94,5 \pm 2,5$

* positiver Inhibitionsindex = Substanz inhibiert; negativer Inhibitionsindex =
Substanz induziert;

DE 101 63 130 A 1

SEQUENZPROTOKOLL

<110> CytoTools GmbH
<120> Apoptotisch wirksame Peptide
5 <130> C 688
<160> 17
<170> PatentIn version 3.1

<210> 1
10 <211> 6
<212> PRT
<213> Künstliche Sequenz

<220>
15 <223> Synthetisches Peptid

<400> 1

20 Arg Ala Tyr Val Val Met
1 5

<210> 2
25 <211> 6
<212> PRT
<213> Künstliche Sequenz

<220>
30 <223> Synthetisches Peptid

<400> 2

35 Arg Trp Tyr Val Val Met
1 5

<210> 3
40 <211> 6
<212> PRT
<213> Künstliche Sequenz

<220>
45 <223> Synthetisches Peptid

<400> 3

50 Arg Tyr Tyr Val Val Met
1 5

55

60

65

DE 101 63 130 A 1

<210>	4	
<211>	6	
<212>	PRT	
<213>	Künstliche Sequenz	5
<220>		
<223>	Synthetisches Peptid	
<400>	4	10
Arg Glu Tyr Val Val Met		
1	5	
		15
<210>	5	
<211>	10	
<212>	PRT	
<213>	Künstliche Sequenz	20
<220>		
<223>	Synthetisches Peptid	
<400>	5	25
Lys Arg Ala Tyr Val Val Met Trp Lys Lys		
1	5	10
		30
<210>	6	
<211>	10	
<212>	PRT	
<213>	Künstliche Sequenz	35
<220>		
<223>	Synthetisches Peptid	
<400>	6	40
Lys Arg Glu Tyr Val Val Met Trp Lys Lys		
1	5	10
		45
<210>	7	
<211>	6	
<212>	PRT	
<213>	Künstliche Sequenz	50
<220>		
<223>	Synthetisches Peptid	
<400>	7	55
Arg Gly Tyr Val Val Met		
1	5	
		60
		65

DE 101 63 130 A 1

<210> 8
 <211> 6
 <212> PRT
 5 <213> Künstliche Sequenz

 <220>
 <223> Synthetisches Peptid

 10 <400> 8

 Arg Met Tyr Val Val Met
 1 5

 15
 <210> 9
 <211> 6
 <212> PRT
 20 <213> Künstliche Sequenz

 <220>
 <223> Synthetisches Peptid

 25 <400> 9

 Arg Thr Tyr Val Val Met
 1 5

 30
 <210> 10
 <211> 6
 <212> PRT
 35 <213> Künstliche Sequenz

 <220>
 <223> Synthetisches Peptid

 40 <400> 10

 Arg Asn Tyr Val Val Met
 1 5

 45
 <210> 11
 <211> 6
 <212> PRT
 50 <213> Künstliche Sequenz

 <220>
 <223> Synthetisches Peptid

 55 <400> 11

 Arg Asp Tyr Val Val Met
 1 5

 60

 65

DE 101 63 130 A 1

<210>	12	
<211>	6	
<212>	PRT	
<213>	Künstliche Sequenz	5
<220>		
<223>	Synthetisches Peptid	
<400>	12	10
Met Val Val Tyr Phe Arg		
1	5	
		15
<210>	13	
<211>	6	
<212>	PRT	
<213>	Künstliche Sequenz	20
<220>		
<223>	Synthetisches Peptid	
<400>	13	25
Arg Ala Tyr Val Val Ala		
1	5	
		30
<210>	14	
<211>	6	
<212>	PRT	
<213>	Künstliche Sequenz	35
<220>		
<223>	Synthetisches Peptid	
<400>	14	40
Arg Leu Tyr Val Val Met		
1	5	
		45
<210>	15	
<211>	6	
<212>	PRT	
<213>	Künstliche Sequenz	50
<220>		
<223>	Synthetisches Peptid	
<400>	15	55
Arg Pro Tyr Val Val Met		
1	5	
		60
<210>	16	
<211>	6	
<212>	PRT	
<213>	Künstliche Sequenz	65

<220>

<223> Synthetisches Peptid

5 <400> 16

Arg Ser Tyr Val Val Met

1 5

10

<210> 17

<211> 6

<212> PRT

<213> Künstliche Sequenz

15

<220>

<223> Synthetisches Peptid

20 <400> 17

Arg Cys Tyr Val Val Met

1 5

25

Patentansprüche

1. Apoptotisch wirksame Substanz, **dadurch gekennzeichnet**, dass sie mindestens einen Peptidanteil mit einer der in den SEQ ID NOs 1 bis 17 dargestellten Aminosäuresequenzen umfasst.
2. Substanz nach Anspruch 1, welche ein Peptid oder Protein ist.
3. Substanz nach Anspruch 1, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus den in SEQ ID NO 1 bis SEQ ID NO 17 dargestellten Peptiden.
4. Substanz nach Anspruch 1, welches ein aus einer der Aminosäuresequenzen SEQ ID NO 1 bis SEQ ID NO 17 abgeleitetes Peptidmimeticum ist.
5. Apoptotisch wirksame Substanz nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens einen Peptidanteil mit einer der in den SEQ ID NOs 1 bis 11 dargestellten Aminosäuresequenzen oder ein davon abgeleitetes Peptidmimeticum umfasst und anti-apoptotisch wirksam ist.
6. Apoptotisch wirksame Substanz nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens einen Peptidanteil mit einer der in den SEQ ID NOs 12 bis 17 dargestellten Aminosäuresequenzen oder ein davon abgeleitetes Peptidmimeticum umfasst und Apoptose-induzierend wirksam ist.
7. Pharmazeutische Zusammensetzung, umfassend mindestens eine Substanz nach einem der Ansprüche 1 bis 6 oder ein pharmazeutisch annehmbares Salz dieser Substanz und einen pharmazeutisch annehmbaren Träger.
8. Verwendung einer Substanz nach einem der Ansprüche 1 bis 6 oder eines pharmazeutisch annehmbaren Salz hierzu zur Herstellung eines Medikamentes.
9. Verwendung einer Substanz nach Anspruch 5 oder eines pharmazeutisch annehmbaren Salz hierzu zur Herstellung eines Medikamentes zur Behandlung der Arteriosklerose.
10. Verwendung einer Substanz nach Anspruch 5 oder eines pharmazeutisch annehmbaren Salz hierzu zur Herstellung eines Medikamentes zur Behandlung der Alzheimer-Erkrankung.
11. Verwendung einer Substanz nach Anspruch 5 oder eines pharmazeutisch annehmbaren Salz hierzu zur Herstellung eines Medikamentes zur Behandlung von AIDS.
12. Verwendung einer Substanz nach Anspruch 6 oder eines pharmazeutisch annehmbaren Salz hierzu zur Herstellung eines Medikamentes zur Behandlung von Krebs.

55

60

65